Iprodione 240 SE

Fongicide quatre saisons à large spectre

Iprodione 240 SE est un fongicide à action rapide, de longue durée, conçu pour le contrôle de la plaque brune, la brûlure en plaques et plusieurs autres maladies du gazon.

- Agit rapidement et assure le contrôle d'un large éventail de maladies dont la plaque brune, la brûlure en plaques et les moisissures des neiges
- Mode d'action systémique et de contact avec une fiabilité résiduelle de 14–21 jours et plus
- Produit de qualité qui procure une protection tout au long de l'année

Formulation	240g/litre
Matière active	Iprodione
Même matière active que	Rovral® Green GT
Emballage	2 x 10 litres (36 caisses/palette)
Taux d'application	Voir la fiche technique pour tous les détails
Mode d'action	Systémique et de contact, utilisé de façon préventive ou curative contre plusieurs maladies du gazon
Groupe	Fongicide du groupe 2
Entreposage	Éviter le gel

Efficace contre :

La fusariose
La plaque brune
La brûlure en plaques
La moisissure grise des neiges
La moisissure rose des neiges
La tache de la feuille

QUALI-PRO®

Produits de qualité pour les gazons

Quali-Pro.ca

Iprodione 240 SE

QUALI-PRO

CONTRÔLE DE LA PLAQUE BRUNE :

Appliquez Quali-Pro Iprodione 240 SE dès les premiers signes de la plaque brune (*Rhizoctonia solani*). L'application foliaire peut être répétée sur un intervalle de 14–21 jours tout au long de la saison, ou au besoin. Lors de contamination sévère, utilisez le taux le plus élevé avec le délai de réinsertion le plus court. Dans le cadre d'un programme de prévention, il est recommandé d'alterner Quali-Pro Iprodione 240 SE avec d'autres fongicides homologués contre la plaque brune pour réduire la possibilité de développer de la résistance à la maladie.

Taux d'application : 125–250mL/100m^2. Durée minimale d'action - 14 jours.

CONTRÔLE DE LA BRÛLURE EN PLAQUES :

Appliquez Quali-Pro Iprodione 240 SE dès les premiers signes de la brûlure en plaques (*Sclerotinia homeocarpa*). L'application peut être répétée au besoin, toutefois, dans le cadre d'un programme de prévention de la brûlure en plaques, Quali-Pro Iprodione 240 SE doit être appliqué en alternance avec d'autres fongicides pour réduire la possibilité de développer de la résistance à la maladie.

Taux d'application : 62mL/100m^2. Durée minimale d'action - 21 jours.

CONTRÔLE DE LA TACHE DE LA FEUILLE ET DE LA FONTE DU SEMIS :

Appliquez Quali-Pro Iprodione 240 SE dès les premiers signes de la tache de la feuille ou de la fonte du semins (*Bipolaris sorokiniana, Drechslera poae*). Au besoin, répétez l'application 2 ou 3 fois au début du printemps dans un intervalle de 14–21 jours. Lors de contamination sévère, utilisez le taux le plus élevé avec le délai de réinsertion le plus court. Dans le cadre d'un programme préventif, il est recommandé d'alterner Quali-Pro Iprodione 240 SE avec d'autres fongicides homologués contre la tache de la feuille afin de réduire la possibilité de développer de la résistance à la maladie.

Taux d'application : 125mL/100m^2. Durée minimale d'action - 14 jours.

CONTRÔLE DE LA MOISISSURE DES NEIGES :

Utilisez Quali-Pro Iprodione 240 SE comme traitement préventif à la moisissure rose (*Microdochium nivale*) et la moisissure grise des neiges (*Typhula* spp.). L'application du produit doit se faire à la fin de l'automne ou au début de l'hiver avant que le sol gèle ou avant la première neige.

La moisissure rose des neiges : Utilisez 250–375mL de Quali-Pro Iprodione 240 SE par 100m^2, appliquez dans un volume d'eau de 8–10L/100m^2. Utilisez le taux le plus élevé aux endroits où vous anticipez une présence accrue de la maladie ou lorsque celle-ci est déjà présente au moment de l'application.

La moisissure grise des neiges : Utilisez 375mL de Quali-Pro Iprodione 240 SE par 100m^2, appliquez dans un volume d'eau de 8–10L/100m^2.

Note : L'application d'une quantité excessive d'engrais azoté provoque la croissance du gazon tard en automne et rend celui-ci plus susceptible aux moisissures et, par conséquent, diminue l'efficacité de Quali-Pro Iprodione 240 SE.

CONTRÔLE DE LA FUSARIOSE (*Microdochium nivale*):

Utilisez 185mL de Quali-Pro Iprodione 240 SE par 100m^2 dans un volume d'eau de 8–10L/100m^2. Appliquez à l'automne ou au printemps sur une base préventive lorsque les conditions climatiques (humide et frais) sont propices au développement de la maladie. Répétez l'application aux 3–4 semaines. Dans les endroits couverts de neige, utilisez le taux suggéré pour la suppression de la moisissure rose des neiges avant l'accumulation au sol.

Taux d'application : 185mL/100m^2.

GESTION DE LA RÉSISTANCE - RECOMMANDATIONS :

Pour retarder la résistance aux fongicides :

- Lorsque c'est possible, alternez l'utilisation de Quali-Pro Iprodione 240 SE ou d'autres fongicides du groupe 2 avec différents groupes qui éliminent les mêmes pathogènes.
- Utilisez des mélanges en réservoir contenant des fongicides de groupe différent (lorsque les instructions sur l'étiquette le permettent).

Pour le mode d'emploi complet, se référer à l'étiquette du produit.

Supérieur ou égal à™

La formulation des produits Quali-Pro® est d'une qualité inégalée qui leur donne une performance équivalente à celle des produits concurrents qu'ils remplacent.

Pour plus d'informations :
Don Surgeoner, directeur de Quali-Pro pour le Canada
(519) 535-2409 • dsurgeoner@manainc.com

™ Supérieur ou égal à est une marques de commerce et ® Quali-Pro est une marque déposée de FarmSaver.com, LLC. ® Rovral est une marques deposées de Bayer. 14008.02.14